

**Комплексная система
защиты семечковых садов
препаратами компании «Август»**



Схема защиты семечковых садов																		
Вредный объект	Распускание почки («зеленый конус»)	Фаза «мышиное ушко»	Обособление бутона	Розовый бутон	Полное цветение	Опадение лепестков	Размер плода слешину	Размер плода с грецкий орех	Формирование и рост плодов	Полное созревание плодов								
Все виды двудольных и злаковых сорняков			Торнадо® 500; Торнадо® 540(при условии защиты культуры)															
Яблонная плодожорка, листовертки, тли			Герольд®				Герольд®											
			Борей®; Борей® Нео; Брейк®; Мамба®; Стилет®; Шарпей®								Борей®; Борей® Нео; Брейк®; Мамба®; Стилет®; Шарпей®; Сирокко®							
Яблонная моль		Шарпей®								Шарпей®								
Клещи		Брейк®; Стилет®								Брейк®								
Парша, мучнистая роса		Раёк®								Раёк® (2 обработки с интервалом 10 - 15 дней)								
Парша		Кумир® (первая обработка)								Кумир® (две обработки с интервалом 7 - 10 дней) Ордан®* (две обработки с интервалом 7 - 14 дней), Ордан® МЦ* (две обработки с интервалом 10 - 14 дней)								
Парша, монилиоз, мучнистая роса		Тирада®																
Гнили плодов при хранении										Тирада®								

* – завершается регистрация препарата для применения на данной культуре