

Комплексная система защиты томатов препаратами компании «Август»



| Схема защиты томатов | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|---|---|--|-----------------------------|----------------------|----------|--------------------|------------|
| Вредный объект | До посева или высадки рассады | Посев или высадка рассады | Фаза 1 – 2 листьев культуры | Фаза 2 – 4 листьев культуры | Фаза 3 – 5 листьев культуры | Фазы активного роста | Цветение | Завязывание плодов | Созревание |
| Все виды двудольных и злаковых сорняков | Торнадо® 500; Торнадо® 540 | | | | | | | | |
| Томаты рассадные: однолетние двудольные и злаковые сорняки | Лазурит® Ультра (однократно) | Лазурит® Супер; Лазурит® Ультра (через 15 - 20 дней после высадки рассады) | | | | | | | |
| Томаты посевные: двудольные и злаковые сорняки | | | Лазурит® Супер; Лазурит® Ультра (однократно или дробно) | | | | | | |
| Томаты рассадные и посевные: многолетние и однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки | | | | Эскудо® (однократно до фазы 3 – 5 листьев культуры или дробно) | | | | | |
| Фитофтороз, бурая пятнистость, альтернариоз | | | | Кумир®; Метаксил®; Ордан®; Ордан® МЦ | | | | | |
| Фитофтороз, мучнистая роса, альтернариоз | | | | | | | Интрада® | | |
| Колорадский жук | | | Борей® | | | | | | |